

Indotyphlops braminus (Culebrilla ciega de las macetas)

Por Aurelio Martín

Pequeña serpiente de unos 12-15 cm, probablemente originaria de India o Sri Lanka, y que ha sido introducida en numerosos lugares del mundo.

En nuestro archipiélago se detectó por primera vez en Gran Canaria en 2004, y con posterioridad en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera. Por su parecido superficial con las lombrices de tierra, es probable que haya pasado desapercibida antes de dicha fecha y que incluso esté presente también en La Palma y El Hierro.

Tiene una gran capacidad dispersora debido a que es transportada en la tierra de macetas y cepellones de plantas agrícolas y ornamentales. Además, se reproduce de forma partenogenética, de tal manera que un solo individuo es capaz de originar nuevas poblaciones. No se conocen ejemplares machos.

En Canarias habita espacios ajardinados, parques, campos de golf y áreas de cultivos en zonas bajas y de medianías. De hábitos subterráneos, sólo se la observa en superficie de forma ocasional, sobre todo después de tiempo lluvioso. Se alimenta de pequeños insectos adultos tales como hormigas, termitas y coleópteros así como de sus huevos y larvas.

Sus poblaciones son localmente abundantes pero a pesar de ello no está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

