

Dendrocopos major (Pico picapinos)

Por Aurelio Martín

Distribuido por gran parte de Eurasia así como en el noroeste de África y Canarias. En nuestro archipiélago solo habita en Tenerife y Gran Canaria, estando representado por sendas subespecies endémicas, *D. m. canariensis* y *D. m. thanneri* respectivamente.

Ave muy llamativa no solo por su colorido sino por el típico tamborileo con el pico en los troncos de los árboles a los cuales se sujeta gracias a la disposición particular de sus dedos, dos hacia delante y dos hacia detrás, así como por la rigidez de su cola. Los sexos son diferenciables gracias a la presencia de una mancha roja en la nuca de los machos.

En Tenerife hasta la década de 1980 estaba restringido a los bosques de pinos más maduros, pero poco a poco ha ido colonizando los pinares que se repoblaron a mediados del siglo XX. Además, en los últimos años se ha expandido a zonas de castaños, núcleos urbanos como La Laguna, Guamasa y Tacoronte, e incluso a zonas de monteverde en el macizo de Anaga. En Gran Canaria ya era conocida su presencia tanto en pinares como en zonas de cultivos arboladas.

Para la nidificación utiliza agujeros en árboles en los cuales pone 4-5 huevos. Se alimenta sobre todo de larvas de insectos que extrae de la corteza de los árboles, pero también consume piñones y almendras llegando incluso a depredar sobre pollos de otras especies.

Está incluido en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y como de Interés Especial en el anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas pero esa categoría debe ser actualizada.

