

## *Falco tinnunculus* (Cernícalo vulgar)

Por Aurelio Martín

Se trata de la rapaz más abundante y con mayor distribución en el archipiélago ocupando todas las islas e islotes. En las islas orientales habita la subespecie endémica *F. t. dacotiae* mientras que en las restantes es sustituida por *F. t. canariensis* también presente en Madeira. Además, se ha constatado que a Canarias llegan ejemplares en migración provenientes del centro y norte de Europa.

Los cernícalos presentan dimorfismo sexual, siendo los machos algo más pequeños que las hembras y mostrando coloración grisácea en la nuca y en la cola.

Se le puede ver desde la costa hasta el matorral de alta montaña incluyendo los núcleos urbanos. Nidifica de forma habitual en oquedades de riscos, acantilados costeros, paredes de barrancos e incluso en edificios. La reproducción en árboles no es muy habitual en Canarias pero en El Hierro no es raro que críen en pinos; en las islas orientales y en Gran Canaria es común la nidificación en palmeras. Las puestas más habituales son de 4 y 5 huevos. La dieta varía según las localidades pero en general es un gran depredador de insectos, lagartos y ratones.

A pesar de su abundancia, al igual que otras rapaces de Canarias, muestra concentraciones elevadas de algunos pesticidas organoclorados tales como DDT y dieldrín; además, sus huevos presentan una mayor cantidad de DDE que los del resto de las rapaces españolas.

La especie está incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y en el obsoleto anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

