

Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)

Por Aurelio Martín

Ave marina de hábitos más bien costeros que se distribuye sobre todo por la cuenca mediterránea, aunque también está presente en el Atlántico desde Francia hasta Canarias y la costa occidental de Marruecos. Las poblaciones de los archipiélagos macaronésicos pertenecen a la subespecie *L. a. atlantis*.

En Canarias sus efectivos son numerosos, del orden de varios miles de parejas, que se distribuyen por todas las islas e islotes. Su presencia es habitual en numerosos lugares costeros pero especialmente en muelles. También puede ser observada tierra adentro en embalses, charcas y basureros, así como en prados donde captura numerosos insectos y caracoles. En la costa aprovecha restos y descartes de peces y cefalópodos, siendo capaz de depredar sobre pequeñas aves marinas como paños y petreles.

Lo normal es que nidifique en colonias, a veces de varios centenares de parejas, que suelen situarse en acantilados costeros de las islas principales así como en roques e islotes. Las puestas de 2-3 huevos tienen lugar en la primera mitad de abril y los pollos nacen a principios de mayo; estos abandonan el nido poco después de la eclosión y se esconden en sus inmediaciones. Los juveniles son de tonos pardos y después de sucesivas mudas alcanzan el plumaje de adulto a los cuatro años de edad. Realizan desplazamientos diarios entre las zonas de alimentación y las colonias de cría que también son utilizadas como dormitorios. Además, se mueven entre islas, muchas veces siguiendo a los barcos.

Siendo una gaviota abundante, cuyas colonias a veces han necesitado ser controladas, no está incluida ni en el Listado y Catálogo Español de Especies Amenazadas ni en el de Especies Protegidas de Canarias.

