

Visnea mocanera L.f (Mocán)

Por Francisco Gonzales Artiles

Árbol endémico de la región macaronésica, presente en Madeira y Canarias. En las islas se encuentra ausente de Lanzarote. Se trata de una especie del monteverde seco, en estrecho contacto con las comunidades termófilas. En Tenerife se distribuye en las medianías de la isla, incluyendo las zonas sur y oeste, mientras que en el resto de las islas donde se encuentra, aparece solamente en las fachadas que reciben la influencia del mar de nubes.

Se trata de un árbol de porte pequeño, generalmente no superior a 10 metros, de aspecto compacto, corteza grisácea y follaje verde oscuro, compuesto por hojas pequeñas, lanceoladas y con el borde generalmente aserrado. Presenta flores hermafroditas, de color blanco cremoso y que forman racimos colgantes. El fruto es una baya que va pasando del color rojo al negro rojizo durante la maduración. Se trata de un fruto comestible, del que hicieron uso los primeros pobladores del archipiélago. Por sus características es apetecido por las aves que favorecen su dispersión.

Tiene un buen comportamiento en las tareas de restauración ecológica de comunidades del monteverde seco, al igual que el madroño, compartiendo con ésta última especie, la dispersión activa que hacen los pájaros de sus frutos, lo que incrementa el impacto positivo de su uso en repoblaciones. Su condición de especie de transición entre comunidades vegetales y su adaptabilidad le da un gran interés frente al cambio climático, permitiendo la recuperación de comunidades arbóreas en las inciertas circunstancias actuales.

