

Chloris chloris (Verderón común)

Por Aurelio Martín

Incluido hasta hace unos años en el género *Carduelis*, el verderón común es un fringílido que recuerda a un canario robusto pero con distintivas manchas amarillas en las alas y bordes externos de la cola. Muy distribuido en Europa, también está presente en el norte de África y algunas zonas de Asia occidental. En los archipiélagos macaronésicos habita en Azores, Madeira y Canarias. Siendo un ave apreciada para mantener en jaulas ha sido introducido en Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia.

En Canarias había sido señalado en el pasado como visitante accidental hasta que en la década de 1960 comenzó a criar en las islas de Tenerife y Gran Canaria. En el resto del archipiélago también se observa pero hay muy pocos datos de reproducción. Es probable que las aves nidificantes en Canarias pertenezcan a la subespecie *C. c. aurantiiventris* la cual se distribuye por el sur de Europa.

Se ha establecido principalmente en zonas antrópicas con algunas arboledas tales como parques, cementerios, bordes de carreteras y cultivos. Nidifica en árboles, muchas veces en cipreses y pinos, siendo el tamaño de la puesta de 3-5 huevos. Después de la reproducción llegan a desaparecer de los lugares de cría realizando movimientos dispersivos hacia otras zonas de la isla. Además, durante el invierno, y sobre todo en las islas orientales, sus efectivos se incrementan con la llegada de ejemplares continentales.

Se alimenta de diversos tipos de semillas pero sobre todo de las de cardos.

No está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ni en los catálogos de especies protegidas de España y Canarias.

