

## *Sonchus bourgeaui* (Cerrajilla moruna)

Por Stephan Scholz

Cuando hacíamos hace unos meses la ficha de la lechuguilla de risco (*Crepis canariensis*), decíamos que esta planta puede confundirse con otras compuestas de flores amarillas, especialmente *Sonchus bourgeaui*. En efecto, en algunas zonas de Fuerteventura como el macizo de Betancuria, las dos especies pueden crecer muy cerca una de otra en el mismo hábitat de ladera de montaña, aunque *Sonchus bourgeaui*, que es una planta anual, tiene un carácter más ruderal. Las dos alcanzan portes parecidos, pero en *Crepis canariensis*, una especie perenne, las hojas son más bien enteras con bordes dentados y los capítulos florales tienen un color amarillo más claro, mientras que *Sonchus bourgeaui* presenta hojas pinnatisectas y capítulos de un amarillo más intenso.

Por otro lado, *S. bourgeaui* podría confundirse con *Sonchus oleraceus* y *Sonchus tenerrimus*. El primero, muy frecuente como mala hierba de jardines y cultivos aunque rara vez presente en medios más naturales alejados de las poblaciones, es también anual, pero tiene los tallos florecidos más erectos y con menos capítulos florales, mientras que en *S. bourgeaui* los tallos floríferos se ramifican a menudo ampliamente hacia los lados, dando a la planta un aspecto más ancho y redondeado, como vemos en la imagen. Además, *S. oleraceus* tiene capítulos de color amarillo limón, en ocasiones bastante pálidos, y brácteas involucrales casi glabras, mientras que en *S. bourgeaui*, los capítulos son de un bonito color dorado y sus brácteas involucrales presentan numerosos pelos glandulares oscuros.

*S. tenerrimus*, por su parte, tiene tallos más endebles, muchas veces inclinados hacia los lados y apoyados sobre plantas vecinas, y es una especie perenne que se propaga por rizomas subterráneos además de por semillas. Es raro en las áreas montañosas, siendo más bien propio de jardines y zonas regadas de las áreas costeras.

Vistas estas diferencias, solo nos queda decir que *S. bourgeaui* es una planta presente en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria así como en el sur de Marruecos. Se han descrito dos variedades: la típica (var. *bourgeaui*) y la var. *imbricatus*, propia de La Isleta en Gran Canaria y del norte de Lanzarote, y que presenta hojas con lóbulos regularmente imbricados.

La foto de la cerrajilla moruna fue tomada el 28 de marzo de 2021 en las montañas próximas a Betancuria, Fuerteventura.



S. Scholz