

Streptopelia risoria (Tórtola rosigrís doméstica)

Por Aurelio Martín

Forma doméstica de “*Streptopelia roseogrisea*”, especie distribuida en una franja al sur del Sáhara desde África occidental hasta la península arábiga, y cuyo nombre científico, por cuestiones de nomenclatura zoológica, ha pasado a denominarse también como el de la forma doméstica.

Se conocen numerosas variantes de coloración, desde el blanco usado por magos en espectáculos, hasta el rojizo, y el propio de la especie silvestre que es muy parecido al de la tórtola turca (*Streptopelia decaocto*).

Debido a escapes o sueltas deliberadas se han establecido algunas poblaciones silvestres en diversos lugares del mundo como Estados Unidos, Nueva Zelanda, etc.

En Canarias, las tórtolas domésticas eran comunes en mercados y tiendas de animales en las décadas de 1970-80, y a partir del inicio de esta última comenzaron a verse ejemplares en libertad en Tenerife y con posterioridad en las restantes islas. La especie ha permanecido asociada a arboledas de núcleos urbanos, siendo cada vez más escasa por hibridación con la tórtola turca que colonizó y se extendió por todo el archipiélago en la década de 1990.

Se alimenta de semillas y de restos de comida que encuentra en parques y terrazas de restaurantes. Puede criar todo el año, siendo la puesta de dos huevos blancos.

Bajo el nombre de *Streptopelia roseogrisea* está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y por tanto está prohibida su posesión y comercio. Con autorización especial, los cabildos de La Palma y de Gran Canaria poseen un pequeño núcleo de ejemplares que son utilizados para incubar huevos y criar pollos de paloma rabiche con la finalidad de reintroducirlas en Gran Canaria.

