



Echium decaisnei subsp. *decaisnei* (Taginaste blanco)

Por Stephan Scholz

Encontramos a este arbusto en gran parte de las medianías de Gran Canaria, de donde es endémico. Es más frecuente en las zonas áridas del oeste y sur de la isla. En las Canarias orientales, las antiguas “Purpurarias”, crece otra subespecie (subsp. *purpuriansis*), a veces tratada como especie independiente (*E. famarae*), nombre que hace alusión al macizo de Famara en el norte de Lanzarote. Este taxón, el taginaste blanco oriental, se diferencia sobre todo por sus hojas, más cortas y anchas que las de los ejemplares de Gran Canaria, además de no tener indumento hispido. Hay que tener especial cuidado de no llevar ejemplares de Gran Canaria a las islas orientales y viceversa, porque se asilvestran con facilidad, pudiendo luego hibridarse con los ejemplares locales.

Como todos los taginastes, *E. decaisnei* es una especie muy ornamental y por ello se emplea con cierta frecuencia en jardinería. Durante la floración, se destaca espectacularmente en los terrenos rocosos donde crece, acompañado de tabaibas, verod es, lavandas, salvia canaria y muchas otras especies.

La foto fue obtenida en enero de 2019 en los riscos de la parte oriental del valle de Tirajana, en Gran Canaria.

