



Linaria cannabina (Pardillo común)

Por Octavio Trujillo

Hasta hace poco, junto con el Jilguero y el Verderón, estaba incluido en el género *Carduelis* dentro de las aves nidificantes canarias. A nivel mundial se reconocen siete subespecies, con una amplia distribución por el norte de África, Eurasia y los archipiélagos de Madeira y Canarias. Este último contienen dos subespecies endémicas, *L. c. harterti* en Lanzarote y Fuerteventura y *L. c. meadewaldoi* en las centrales y occidentales. Tiene un dimorfismo sexual bien definido, ya que los machos presentan un dorso más teja, y en época reproductiva una coloración rojiza en la frente y el pecho.

Esta característica y su apreciado canto hizo que muchos ejemplares fueran capturados de forma tradicional y que incluso se utilizaran para obtener híbridos con canarios domésticos. No obstante, en la actualidad la reducción generalizada del tamaño y distribución de sus poblaciones se debe más a la destrucción y degradación de sus hábitats, debido a las construcciones urbanas y la modificación de los cultivos tradicionales, con la proliferación de invernaderos y reducción en la siembra de cereales.



Foto. Ejemplar macho de la subespecie *L. c. meadewaldoi*

Por lo general se distribuye preferentemente por ciertas áreas de cultivos de medianías más bien abiertos, así como en algunos ambientes del bosque termófilo y en zonas más frondosas del piso basal, llegando a nidificar entre los plantones de tomateras que se cultivaban al aire libre y muy cerca de la costa, como en Maspalomas, en Gran Canaria. En esta isla es común también en el municipio de mayor altitud, como es Artenara, por lo que la presencia de arbustos combinado con grandes extensiones de herbáceas, principalmente gramíneas y cardos, parecen condicionar la preferencia de sus hábitats. Una vez finalizada la reproducción pueden formar grandes bandos que realizan extensos desplazamientos en busca de alimento.

La nidificación se inicia en los meses de enero-febrero en las cotas más bajas y febrero-marzo en las medianías y se extienden hasta el mes de julio. Normalmente ponen 4 huevos, en nidos que instalan a baja altura, entre uno y dos metros y en arbustos de pequeño porte como brezos, zarzas, jaras, aulagas o espinos, e incluso en árboles como acebuches. Se alimentan de gran variedad de semillas, preferentemente de gramíneas, compuestas y crucíferas.



Foto. Ejemplar macho de la subespecie *L. c. harterti* en los altos del Risco de Famara.