

Género *Mobula* (Mantas en Canarias)

Por Alberto Brito

Son varias las especies de Mantas o Maromas que se registran en aguas canarias, de las cuales la más frecuente es *Mobula tarapacana* (Philippi, 1892), una especie de boca ínfera (situada en posición ventral) que se distingue bien por su color dorsal uniforme gris verdoso oliváceo y amplias bandas oscuras en la cara ventral de las aletas pectorales.

Desde finales de los años setenta y ochenta conocemos la presencia de grandes agrupaciones de dicha especie, sobre todo en las islas occidentales, particularmente en El Hierro; después de enrarecerse mucho en las siguientes décadas vuelve a ser frecuente en los últimos años.

La segunda especie en frecuencia es la gran manta *Mobula birostris* (Walbaum, 1792), de boca frontal y color ventral muy variable, aunque generalmente con el borde en torno a la boca negruzco y manchas negras ventrales generalmente simétricas. Existe otra especie de boca frontal, *Mobula alfredi* (Kreff, 1868), donde la presencia en la actualidad es dudosa. Existe una cita antigua para Senegal y también recientes para las islas de Cabo Verde y Canarias, en base a fotografías de ejemplares. Dichas fotografías, que muestran el patrón de coloración característico de la especie, entorno de la boca blanco y manchas ventrales irregulares, aportaron información suficiente para que los especialistas consideraran que esta manta se distribuye exclusivamente en el Indopacífico, no pudiendo certificar si los ejemplares atlánticos corresponden a *M. alfredi*.

Bastante más rara es la presencia de *Mobula mobular* (Bonnaterre, 1788), de coloración dorsal gris negruzca con un patrón característico de manchas negras y claras, así como una larga cola. Otra especie tropical de boca ínfera y de presencia esporádica es *Mobula thurstoni* (Lloyd, 1908) que, aunque no se ha citado en el archipiélago es probable que su presencia no sea reciente y haya pasado desapercibida. Se distingue por el sombreado oscuro del margen ventral de las aletas pectorales, la forma del borde de dichas aletas, la presencia de una marca negra en el borde delantero de las mismas y la longitud de la cola (mucho más corta que en *M. mobular*).



© Alberto Brito